



Pecuária Forte e Saudável



REPRODUÇÃO EM GADO LEITEIRO

O uso da Homeopatia varia conforme seu problema!!
Fale conosco e use nossos produtos da forma mais eficaz para atender sua necessidade.

Ligue 0800 602 0008
31 99379 0167



Produto Homeopático

NÃO contém HORMÔNIOS e nem PESTICIDAS.
O produto não agride o meio ambiente, não tem risco para saúde pública e animal.

0800 602 0008
WWW.PECNEW.COM.BR

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE
PECNEW PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
CNPJ : 06.073.606 /0002 - 14
Rodovia Neves, 806 Distrito Vera Cruz de Minas
Pedro Leopoldo MG
INDUSTRIA BRASILEIRA
Resp. Tec. Dr. Jarbas Caetano Amâncio
Médico Veterinário CRMV-MG-4254

31 99370 0162



0800 602 0008
www.pecnew.com.br



REPRODUÇÃO EM GADO LEITEIRO

O ser vivo com sua energia vital em equilíbrio e em total potência não adocece. Uma matriz sadia, com sua energia vital bem composta vai ser um animal preparado para combater qualquer adversidade que surgir, tornando um animal de produção por excelência, manifestando assim todo o seu potencial genético. Já para um animal doente, usamos a homeopatia para tratar o organismo debilitado, desequilibrado e não a doença.



Para rentabilidade na atividade leiteira, é necessário ter uma alta eficiência reprodutiva

A puberdade em novilhas Holandesas acontece quando seu peso corporal aproxima-se de 50-55% do seu peso adulto. Assim, preconiza-se que a primeira cobertura ocorra entre 60-65% do peso adulto e que, ao primeiro parto, a novilha tenha 85-90% do peso adulto.

Na prática, significa que o produtor deve conhecer o peso adulto de seu rebanho, o que deve ser feito com a pesagem de uma amostra de vacas em lactação e secas.

Os animais gestantes também requerem cuidados especiais. Durante a gestação, novilhas e vacas secas devem ser mantidas bem alimentadas. No terço final de gestação, é o momento que o feto tem seu maior desenvolvimento e isso exige mais da mãe. Esse animal deve permanecer em um ambiente tranquilo com alimentos e água de boa qualidade.

Muitos são os fatores que comprometem a reprodução animal, afetando desde a manifestação de cio até o parto. Mas uma vaca sadia pode evitar a maioria destes problemas.

Uma boa eficiência reprodutiva caracterizada-se por curtos intervalos entre partos. Isso faz com que a propriedade tenha uma alta taxa de natalidade e elevada porcentagem de vacas em lactação.

É importante o diagnóstico de gestação pelo médico veterinário. Além da confirmação da gestação, o diagnóstico permite identificar os animais que não ficaram gestantes e os que não repetiram o cio.

Os animais que apresentarem doenças ou alterações no sistema reprodutivo de vem ser tratados para voltar ao status reprodutivo normal.

A lactação deve durar 305 dias, considerando-se um intervalo de partos de 12 meses embora 13-14 meses são considerados bons. A lactação deve ser encerrada respeitando 45 dias de período seco.

A saúde da vaca no início da lactação depende em grande parte do que acontece durante o pré-parto.

O ECC (escore da condição corporal) é medido de 1 a 5. O ideal é que vacas de raças especializadas tenham um ECC ao parto entre 3,0 e 3,5 e vacas mestiças tenham entre 3,5 e 4,0. Vacas que parirem magras, com ECC abaixo do recomendado, demoram mais tempo para retornar ao cio no pós-parto.

Após o parto, há uma redução do ECC nos primeiros 60 a 90 dias de lactação. O ideal é que a redução de escore não ultrapasse 0,5 pontos.

O período de involução uterina deve ser de 24 dias, quando ultrapassa este período aumenta o tempo do primeiro cio pós parto e a fertilidade da vaca é reduzida. Vaca que teve retenção de placenta deve ter um cuidado especial, pois vai retardar sua involução uterina.

Deve-se implantar o programa "Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF)", para melhorar o desempenho reprodutivo do rebanho. Vacas devem ser inseminadas de 40 a 60 dias pós parto e não se deve inseminá-las com mais de 120 dias de lactação. Esses animais devem ser monitorados pela sua produção leiteira e se essa produção for abaixo do desejado para a fazenda, devem ser secas e submetidas ao "Protocolo de Indução de Lactação".

REPRODUÇÃO EM GADO LEITEIRO

Deve-se oferecer o mais cedo possível medicamentos homeopáticos, para evitar desequilíbrios provocados pelas formas de manejos e ambiências desfavoráveis, ou mesmo por doenças que acometem as bezerras com o propósito de diminuir a morbidade das doenças.



MEDICAMENTOS PECNEW

SAÚDE-

Este medicamento pode ser oferecido para qualquer fase de produção, tanto na fase de crescimento quanto na fase de produção, momento em que os animais precisam de mais resistência para suportar as adversidades. Promove equilíbrio no crescimento ósseo, muscular e formação de órgãos aumenta a imunidade, diminui o stress e melhora a conversão alimentar.

Recomendação: - 20g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.

FERTILIDADE-

Este medicamento deve ser oferecido para novilhas acima de 1 ano. Para as vacas que entram no pré parto e em reprodução, tem como objetivo aumentar a fertilidade e por consequência a idade ao primeiro parto e diminuir o intervalo entre partos.

Recomendação: - 10g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.

PODODERMATITE-

Este medicamento deve ser oferecido logo no início da recria para melhorar a saúde do locomotor em especial os cascos.

Para uma boa reprodução e se tornar uma matriz fértil, este animal vai precisar de bons cascos para poder se locomover com facilidade e também não comprometer sua imunidade.

Recomendação: - 10g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.

Em caso de animais com problemas clínicos: 100g/cab/dia, até desaparecer os sintomas.

SEPTBIO:

Em caso de retenção de placenta, parto destócico, metrite ou qualquer acometimento infeccioso no útero.

Fornecer 600 g do «SEPTBIO PECNEW» por dia durante 7 dias, 300g cedo e 300g a tarde

ou
Fornecer 30 ml «SEPTBIO PECNEW» por dia durante 7 dias, na ração ou direto na boca