



Pecuária Forte e Saudável



CONTROLE DE MASTITE

O uso da Homeopatia varia conforme seu problema!!
Fale conosco e use nossos produtos da forma mais eficaz para atender sua necessidade.

Ligue 0800 602 0008
31 99379 0167



Produto Homeopático

NÃO contém HORMÔNIOS e nem PESTICIDAS.
O produto não agride o meio ambiente, não tem risco para saúde pública e animal.

0800 602 0008
WWW.PECNEW.COM.BR

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE
PECNEW PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
CNPJ : 06.073.606 /0002 - 14
Rodovia Neves, 806 Distrito Vera Cruz de Minas
Pedro Leopoldo MG
INDUSTRIA BRASILEIRA
Resp. Tec. Dr. Jarbas Caetano Amâncio
Médico Veterinário CRMV-MG-4254

31 99370 0162



0800 602 0008
www.pecnew.com.br



CONTROLE DE MASTITE

O animal tem dois cérebros: o órgão normal, que absorve emoções que vêm da ambiência a qual ele é submetido e os intestinos, que absorvem nutrientes. Essa ambiência deve ser de qualidade associado a alimentos muito bem equilibrados. Com a homeopatia, podemos corrigir uma série de desvios, diante dos desafios do confinamento.



O QUE É MASTITE?

Mastite clínica - Caracteriza-se pelo aparecimento de edemas, aumento de temperatura, endurecimento e dor na glândula mamária ou aparecimento de grumos, pus ou quaisquer alterações das características do leite.

Mastite subclínica - Caracteriza-se por não apresentar sinais visíveis e passar despercebida pelos proprietários e pelos empregados. Além disso, promove alterações na composição do leite, tais como aumento na CCS e alterações nos teores de caseína, cálcio, gordura e lactose.

CONTROLE E PREVENÇÃO DA MASTITE

Mastite contagiosa - Deve-se diminuir a exposição dos tetos aos patógenos. Aumentar a da imunidade da vaca tendo como objetivo a redução do nível de novas infecções. Fazer tratamento de vacas secas e o de novilhas no pré-parto.

Mastite ambiental - Manter um rígido controle higiênico-sanitário ambiental por meio da limpeza dos pastos, estábulos e da sala de ordenha, evitando o acúmulo de fezes e esterco. Um correto manejo de ordenha inclui procedimentos de desinfecção dos tetos, antes e depois da ordenha.

Pré-dipping - Essa medida determina redução de até 50% na taxa de novas infecções da glândula mamária.

Pós-dipping - É a desinfecção dos tetos ao final da ordenha. Deve-se enfatizar que a imersão dos tetos, "teat dipping", deve ser completa, isto é, pelo menos dois terços dos tetos devem ser imersos completamente na solução desinfetante.

O CORRETO MANEJO DA LINHA DE ORDENHA :

Consiste em ordenhar as vacas mais jovens e, em seguida, as mais velhas que não tiveram mastite. Depois, ordenham as que sofreram a doença e recuperaram; por último, ordenham-se as portadoras de mastite (ordenhando primeiro os quartos não afetados).

Cuidados do ordenhador : Os cuidados do ordenhador são um dos pontos de maior importância em todo o processo, pois, da qualificação e do envolvimento desse elemento dependerá a efetiva execução de todas as recomendações;

A ordenhadeira mecânica pode atuar como um meio de transmissão, uma vez mau higienizada. O nível de vácuo da ordenhadeira deve ser regulado adequadamente.

A limpeza da ordenhadeira deve ser feita com água de qualidade e de boa procedência.

CONTROLE DE MASTITE

Lembre-se que a única forma de não descartar leite é usar, no controle da mastite, os medicamentos homeopáticos PECNEW. Jogar leite fora é prejuízo.



PROGRAMA CONTÍNUO DE CONTROLE DE MASTITE

MASTITE :

MODO DE USO:

Misturar na ração/concentrados, colocando sobre os alimentos no cocho doses conforme a produção.

Alta, Média e Baixa produção : Fornecer, no mínimo, 10g/cab/dia, adicionar nas rações ou farelos, garantindo a ingestão final de 1 g/L de leite/dia.

Fazendo uma inclusão na ração de 3 kg de « MASTITE PECNEW» por 1000 kg de ração. Fornecer desta mistura no mínimo 1 kg por 3 litros de leite produzido.

Nos casos graves e nas Mastites de repetição (crônicas), consultar o programa **ANTIBIÓTICO ZERO**.

AÇÃO:

- Reduz as mastites clínicas e subclínicas e, conseqüentemente, reduzindo a Contagem de Células Somáticas (CCS), desde que associada à tática de manejo e análises confiáveis.

- Melhora a qualidade do leite e reduz o custo de produção, evitando o prejuízo com o descarte do leite.

- Estimula o sistema imunológico e aumenta a resposta do úbere às infecções.

- Reduz ou elimina a necessidade de tratamentos convencionais.

TRATAMENTO DE MASTITE CLÍNICA

Fornecer 600 g do «**MASTITE PECNEW**» por dia durante 7 dias, 300g cedo e 300g à tarde ou em casos mais graves

Fornecer 600 g do «**SEPTBIO PECNEW**» por dia durante 7 dias, 300g cedo e 300g à tarde ou

Fornecer 30 ml «**SEPTBIO PECNEW**» por dia durante 7 dias, na ração ou direto na boca

PROGRAMA ANTIBIÓTICO ZERO

1- Tratamento preventivo e curativo para todos os animais em lactação com **MASTITE** e **PODODERMATITE**, conforme o «**PROGRAMA DE CONTROLE DE MASTITE CONTINUO**».

2 - tratamento de todas as vacas com CCS alta e com histórico de mastite clínica recorrente na fazenda, conforme o «**TRATAMENTO DE MASTITE CLÍNICA**».

3 - tratamento dos casos clínicos, conforme o «**TRATAMENTO DE MASTITE CLÍNICA**».

ATENÇÃO: todos os tratamentos acima são realizados com os produtos PECNEW, sem uso de antibióticos.