



Pecuária Forte e Saudável



PRÉ E PÓS-PARTO

O uso da Homeopatia varia conforme seu problema!!
Fale conosco e use nossos produtos da forma mais eficaz para atender sua necessidade.

Ligue 0800 602 0008
31 99379 0167



Produto Homeopático

NÃO contém HORMÔNIOS e nem PESTICIDAS.
O produto não agride o meio ambiente, não tem risco para saúde pública e animal.

0800 602 0008

WWW.PECNEW.COM.BR

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE
PECNEW PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
CNPJ : 06.073.606 /0002 - 14
Rodovia Neves, 806 Distrito Vera Cruz de Minas
Pedro Leopoldo MG
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Resp. Tec. Dr. Jarbas Caetano Amâncio
Médico Veterinário CRMV-MG-4254

31 99370 0162



0800 602 0008
www.pecnew.com.br



PRÉ E PÓS-PARTO

O ser vivo com sua energia vital em equilíbrio e em total potência não adocece . Uma matriz sadia, com sua energia vital bem composta vai ser um animal preparado para combater qualquer adversidade que surgir, tornando um animal de produção por excelência, manifestando assim todo o seu potencial genético. Já para um animal doente, usamos a homeopatia para tratar o organismo debilitado, desequilibrado e não a doença.



Tem que encerrar a lactação em torno de 45 dias antes do próximo parto. A lactação deve durar 305 dias, considerando-se um intervalo de partos de 12 meses embora 13-14 meses são considerados bons.

O pré-parto é compreendido pelos últimos 30 dias de gestação, quando o feto (bezerro) e a glândula mamária tem o seu desenvolvimento final. O manejo pré-parto visa preparar a vaca para uma nova lactação e deve se iniciar pela adaptação do animal à dieta das vacas em lactação, ou seja, recebendo o mesmo volumoso das vacas em lactação e iniciando-se o fornecimento de concentrado, em menores quantidades (0,5 a 1% do peso vivo).

O ECC (escore da condição corporal) é medido de 1 a 5. O ideal é que vacas de raças especializadas tenham um ECC ao parto entre 3,0 e 3,5 e vacas mestiças tenham entre 3,5 e 4,0. Vacas que parirem magras, com ECC abaixo do recomendado, demoram mais tempo para retornar ao cio no pós-parto.

A saúde da vaca no início da lactação depende em grande parte do que acontece durante o pré-parto. Vacas devem parir com condição corporal boa, não devendo estar muito gordas. No último mês de gestação, os nutrientes são direcionados para a glândula mamária e, principalmente, para o útero, para atender a demanda de crescimento final do bezerro. Vacas gordas (ECC > 4,0) podem apresentar grande queda de consumo de alimentos nos últimos dias antes do parto e no início de lactação e são mais susceptíveis a doenças metabólicas como cetose, esteatose hepática (fígado gorduroso) e retenção de placenta.

Após o parto, há uma redução do ECC nos primeiros 60 a 90 dias de lactação. O ideal é que a redução de escore não ultrapasse 0,5 pontos.

O período de involução uterina deve ser de 24 dias, quando ultrapassa este período aumenta o tempo do primeiro cio pós parto e a fertilidade da vaca é reduzida, aumentando o intervalo entre partos.

Vaca que teve retenção de placenta, metrites no pós-parto ou mesmo qualquer intervenção intra-útero ao parto deve ter uma atenção especial e sere tratada para voltar ao status reprodutivo normal, para evitar um retardamento na involução uterina.

Deve-se implantar o programa “Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF)”, para melhorar o desempenho reprodutivo do rebanho. Vacas devem ser inseminadas de 40 a 60 dias pós parto e não se deve inseminá-las com mais de 120 dias de lactação. Esses animais devem ser monitorados pela sua produção leiteira e se essa produção for abaixo do desejado para a fazenda, devem ser secas e submetidas ao “Protocolo de Indução de Lactação”.

PRÉ E PÓS-PARTO

Deve-se oferecer o mais cedo possível medicamentos homeopáticos, para evitar desequilíbrios provocados pelas formas de manejos e ambiências desfavoráveis.



MEDICAMENTOS PECNEW

PERI-PARTO-

Este medicamento deve ser oferecido no pré-parto. Promove um parto equilibrado evitando o parto distócico e retenção de placenta, promovendo uma boa saúde para a vaca ao iniciar uma nova lactação.

Recomendação: - 20g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.

FERTILIDADE-

Este medicamento deve ser oferecido para as vacas que entram no pré e pós-parto até a confirmação da prenhes. O objetivo é auxiliar na recuperação do útero e aumentar a fertilidade e por consequência diminuir o intervalo entre partos.

Recomendação: - 10g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.

PODODERMATITE-

Este medicamento deve ser oferecido no pré-parto para que as vacas tenham bons cascos e pernas em sua nova lactação. Vacas com cascos saudáveis têm uma boa reprodução e se tornam matrizes férteis, com um intervalo entre partos dentro do ideal.

Recomendação pré-parto - 20g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.

Em caso de animais com problemas clínicos: 100g/cab/dia, até desaparecer os sintomas.

SEPTBIO-

Em caso de retenção de placenta, parto destócico, metrite, tratar ou prevenir qualquer acometimento infeccioso no útero, principalmente em caso de intervenções uterinas.

Fornecer 600 g do «SEPTBIO PECNEW» por dia durante 7 dias, 300g cedo e 300g a tarde

ou

Fornecer 30 ml «SEPTBIO PECNEW» por dia durante 7 dias, na ração ou direto na boca