



Pecuária Forte e Saudável



RECRIA DE NOVILHAS LEITEIRAS

O uso da Homeopatia varia conforme seu problema!!
Fale conosco e use nossos produtos da forma mais eficaz para atender sua necessidade.

Ligue 0800 602 0008
31 99379 0167



Produto Homeopático

NÃO contém HORMÔNIOS e nem PESTICIDAS.
O produto não agride o meio ambiente, não tem risco para saúde pública e animal.

0800 602 0008
WWW.PECNEW.COM.BR

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE
PECNEW PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
CNPJ : 06.073.606 /0002 - 14
Rodovia Neves, 806 Distrito Vera Cruz de Minas
Pedro Leopoldo MG
INDUSTRIA BRASILEIRA
Resp. Tec. Dr. Jarbas Caetano Amâncio
Médico Veterinário CRMV-MG-4254

31 99370 0162



0800 602 0008
www.pecnew.com.br



RECRIA DE NOVILHAS LEITEIRAS

O ser vivo com sua energia vital em equilíbrio e em total potência não adoce. Uma matriz sadia, com sua energia vital bem composta vai ser um animal preparado para combater qualquer adversidade que surgir, tornando um animal de produção por excelência, manifestando assim todo o seu potencial genético. Já para um animal doente, usamos a homeopatia para tratar o organismo debilitado, desequilibrado e não a doença.



A fase de recria inicia-se após o desmame e dura até a idade do parto. Esta fase exige muita atenção do produtor, pois os requerimentos do animal em crescimento estão constantemente mudando, embora devam seguir as recomendações específicas de cada raça.

Tem que evitar que as novilhas fiquem gordas, não é um bom objetivo. Esses animais costumam apresentar muitos problemas ao parto e no período logo após o parto (acúmulos de gordura na glândula mamária, menor consumo de MS e doenças metabólicas, tais como: cetose, problemas de casco e reprodutivos).

A puberdade ou a idade ao primeiro cio aparece antes do peso ideal à cobertura e para isso é preciso separar o macho ou touro das novilhas para evitar o acasalamento em idade ou peso não desejado.

A idade à cobertura é importante, mas o peso à cobertura é mais importante ainda e este é determinado pela alimentação, sendo o principal fator para diminuir a idade a primeira cria.



Idades à cobertura mais precoces (15 meses) exigirão mais nutrientes e assim alimentos de melhor qualidade.

As vezes é preferível atrasar a idade à cobertura para obter peso ao parto.

O peso vivo à cobertura das novilhas varia de acordo com a raça. Assim, preconiza-se que a primeira cobrição ocorra entre 60-65% do peso adulto e que, ao primeiro parto, a novilha tenha 85-90% do peso adulto.

Deste modo, a alimentação das novilhas será aquela que, de forma mais econômica, permita que elas atinjam o peso à cobertura.

RECRIA DE NOVILHAS LEITEIRAS

Deve-se oferecer o mais cedo possível medicamentos homeopáticos, para evitar desequilíbrios provocados pelas formas de manejos e ambiências desfavoráveis, ou mesmo por doenças que acometem as bezerras com o propósito de diminuir a morbidade das doenças.



MEDICAMENTOS PECNEW

SAÚDE-

Este medicamento pode ser oferecido para qualquer fase de produção, em especial para a fase de crescimento. Promove equilíbrio no crescimento ósseo, muscular e formação de órgãos aumenta a imunidade, diminui o stress e melhora a conversão alimentar.

Recomendação: - 20g/cab/dia, misturado no sal mineral ou na ração.

PARASITÁRIO-

Este medicamento pode ser oferecido para qualquer fase de produção, tem como objetivo combater parasitas internos e externos, diminuindo a competição do indivíduo com os parasitos por nutrientes.

Recomendação: - 8g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.

FERTILIDADE-

Este medicamento deve ser oferecido para novilhas acima de 1 ano, tem como objetivo aumentar a fertilidade e por consequência a idade ao primeiro parto.

Recomendação: - 10g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.

PODODERMATITE-

Este medicamento deve ser oferecido logo no início da recria para melhorar a saúde do locomotor em especial os cascos.

Para uma boa lactação e se tornar uma matriz fértil, este animal vai precisar de bons cascos para poder se locomover com facilidade e também não comprometer sua imunidade.

Recomendação: - 10g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.

Em caso de animais com problemas clínicos: 100g/cab/dia, até desaparecer os sintomas.